

آبسه دندان:

عفونت های با منشأ دندانی شایع ترین عفونت ها در میان عفونت های سر و گردن است و بیشتر در ریشه دندان متمرکز می ماند اما در بعضی موارد به بافت های اطراف پخش می شود

علائم بیماری:

درد هنگام جویدن ، التهاب ، قرمزی ، حساسیت دندان به گرما و سرما و سخت باز شدن دهان است و علائم عمومی شامل تب ، میزان نبض و تنفس بالا و التهاب غدد لنفاوی موضعی است .

توصیه های پس از ترخیص:

- ۱- چنانچه در محل آبسه درن وجود دارد بایستی حداکثر ۷۲ ساعت بعد به درمانگاه مراجعه نمایید تا در صورت لزوم درن تعویض و یا خارج شود .
- ۲- تعویض پانسمان روزانه ضروری می باشد.
- ۳- شستشوی مرتب داخل دهان چنانچه درن داخل دهانی باشد ضرورت دارد.
- ۴- آنتی بیوتیک های تجویز شده را طبق دستور مصرف کنید.
- ۵- در صورت تب و لرز به درمانگاه مراجعه نمائید.
- ۶- در صورت علائمی نظیر استفراغ و تهوع و دل پیچه در اولین فرصت به پزشک خود مراجعه کنید.
- ۷- در اولین فرصت ممکن نسبت به خارج کردن عامل عفونت که معمولاً دندان پوسیده است اقدام نمائید.

